

対象疾病名	レジメン名	薬剤名	1回投与量	単位	投与回数(/日)	投与時間	投与経路	投与日(day)	1コース(週)
全身性ALアミロイドーシス	DCyBorD療法(1-2サイクル)	ダラキューロ	1800	mg	1		sc	1,8,15,22	4
		エンドキサン	300	mg/m ²	1		po	1,8,15,22	
		ベルケイド	1.3	mg/m ²	1		sc	1,8,15,22	
		デキサメタゾン	20	mg	1		po	1~2,8~9,15~16,22~23	
	DCyBorD療法(3-6サイクル)	ダラキューロ	1800	mg	1		sc	1,15	4
		エンドキサン	300	mg/m ²	1		po	1,8,15,22	
		ベルケイド	1.3	mg/m ²	1		sc	1,8,15,22	
		デキサメタゾン	20	mg	1		po	1~2,8~9,15~16,22~23	
	DCyBorD療法(7サイクル以降)	ダラキューロ	1800	mg	1		sc	1	4
		デキサメタゾン	20	mg	1		po	1	
CLL/SLL	Venetoclax+Obinutuzumab(サイクル1)	ベネクレクスタ	20	mg	1		po	22~28	4
		ガザイバ	100	mg	1	6時間	div	1	
		ガザイバ	900	mg	1	6時間	div	2	
		ガザイバ	1000	mg	1	6時間	div	8,15	
	Venetoclax+Obinutuzumab(サイクル2)	ベネクレクスタ	50	mg	1		po	1~7	4
		ベネクレクスタ	100	mg	1		po	8~14	
		ベネクレクスタ	200	mg	1		po	15~21	
		ベネクレクスタ	400	mg	1		po	22~28	
		ガザイバ	1000	mg	1	6時間	div	1	
	Venetoclax+Obinutuzumab(サイクル3-6)	ベネクレクスタ	400	mg	1		po	1~28	4
		ガザイバ	1000	mg	1	6時間	div	1	
	Venetoclax+Obinutuzumab(サイクル7-12)	ベネクレクスタ	400	mg	1		po	1~28	4
AML	AZA+Venetoclax (1サイクル目)	ビダーザ	75	mg/m ²	1		sc	1~7	4
		ベネクレクスタ	100	mg	1		po	1	
		ベネクレクスタ	200	mg	1		po	2	
		ベネクレクスタ	400	mg	1		po	3~28	
	AZA+Venetoclax (2サイクル目以降)	ビダーザ	75	mg/m ²	1		sc	1~7	4
		ベネクレクスタ	400	mg	1		po	1~28	
	シタビン少量療法+Venetoclax (1サイクル目)	キロサイド	20	mg/m ²	1		sc	1~10	4
		ベネクレクスタ	100	mg	1		po	1	
		ベネクレクスタ	200	mg	1		po	2	
		ベネクレクスタ	400	mg	1		po	3	
		ベネクレクスタ	600	mg	1		po	4~28	
	シタビン少量療法+Venetoclax (2サイクル目以降)	キロサイド	20	mg/m ²	1		sc	1~10	4
		ベネクレクスタ	600	mg	1		po	1~28	
ATLL	モガムリズマブ	ポテリジオ	1	mg/kg	1	2時間	div	1,8,15,22,29,36,43,50	8

対象疾病名	レジメン名	薬剤名	1回投与量	単位	投与回数(/日)	投与時間	投与経路	投与日(day)	1コース(週)
末梢性T細胞リンパ腫	Romidepsin単独療法	イストダックス	14	mg/m ²	1	4時間	div	1,8,15	4
	A+CHP療法	エンドキサン	750	mg/m ²	1	2時間	div	1	3
		ドキソルピシン	50	mg/m ²	1		iv	1	
		アドセトリス	1.8	mg/kg	1	0.5時間	div	1	
		プレドニン	100	mg	1		iv	1	
		プレドニゾロン	100	mg	1		po	2～5	
APL	APL212G ATO（地固め①～②）	トリセノックス	0.15	mg/kg	1	2時間	div	1～5,8～12,15～19,22～26,29～33	5
	ATO(寛解導入)※最大60日まで	トリセノックス	0.15	mg/kg	1	2時間	div	1～56	8
MDS	アザンチジン	ビダーザ	75	mg/m ²	1		sc	1～7	4
WM/LPL	Ibrutinib+Rituximab(1,5コース目)	リツキサン	375	mg/m ²	1	4時間	div	1,8,15,22	4
		イムブルピカカプセル	420	mg	1		po	1～28	
	Ibrutinib+Rituximab(2-4,6コース目以降)	イムブルピカカプセル	420	mg	1		po	1～28	4